

U Zagrebu, _____ 2021.
(mjesto) (datum)

Potvrda o cijepljenju protiv COVID-19

Ovime potvrđujemo da je _____ (upisati ime i prezime), rođen/a _____ (upisati datum rođenja dd.mm.gggg.), OIB: _____ (MBO u nedostatku OIB-a ili broj putovnice za strance) primio/la dana _____ (upisati datum cijepljenja dd.mm.gggg) prvu/dругu dozu (zaokružiti dozu u slijedu cijepljenja) cjepiva protiv COVID-19, proizvođača AstraZeneca, nositelja odobrenja za stavljanje u promet AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Švedska, zaštićenog naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca, serija _____

Potpis liječnika: _____

Osnovne Informacije o cjeplivu

Cjepivo protiv COVID-19, proizvođača Astrazeneca, *COVID-19 Vaccine AstraZeneca, suspenzija za injekciju cjepivo protiv COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantno])* prima se u dvije doze, s razmakom od najmanje četiri tjedna, a preporučljiv je razmak osam do 12 tjedana.

Očekivana djelotvornost cjepiva je preko 60-70%, što znači da će cijepljenje spriječiti bolest u šest do sedam od deset osoba izloženih infekciji. Očekivana djelotvornost u sprječavanju teških oblika bolesti koji zahtijevaju hospitalizaciju je praktički 100%

Potpun zaštitni učinak cijepljenja se očekuje dva tjedna nakon primjene druge doze cjepiva. Dio cijepljenih osoba već dva tjedna nakon prve doze stekne određenu razinu zaštite koja je kratkotrajna te je u svrhu postizanja očekivane zaštite nužno primiti i drugu dozu cjepiva.

Cjepivo ne smiju primiti osobe koje su alergične na sastojke cjepiva te s oprezom treba pristupiti cijepljenju osoba koje su ranije imale teške alergijske reakcije na neki lijek (ili cjepivo) primijenjen parenteralnim putem (u obliku injekcije/infuzije). Drugu dozu cjepiva ne smiju primiti osobe koje su imale tešku alergijsku reakciju nakon primjene prve doze.

Osobe alergične na hranu i okolišne čimbenike poput peludi, otrova kukaca, dlaku životinja i slično, mogu se cijepiti.

Radi predostrožnosti, nakon cijepljenja treba ostati u blizini liječnika, npr. u čekaonici, 15-30 minuta poslije cijepljenja i javiti se odmah liječniku koji je cijepio ako se počnete loše osjećati.

Uobičajene reakcije na cjepivo, koje se mogu javiti unutar tjedan dana nakon cijepljenja su glavobolja, umor, bol i oticanje na mjestu primjene cjepiva, bolovi u mišićima i zglobovima, zimica i povišena tjelesna temperatura. Te reakcije traju jedan do dva dana. Za dodatne informacije o mogućim nuspojavama upitajte liječnika i/ili za cjelovite informacije o cjeplivu, pročitajte uputu o lijeku, koja je dostupna na stranicama Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode: <https://www.halmed.hr/upl/lijekovi/PIL/Moderna-PIL.pdf>

S obzirom da manji dio cijepljenih osoba (svaka deseta cijepljena osoba) ne razvije odgovarajuću zaštitu, potrebno je i nakon cijepljenja pridržavati se osnovnih mjera za sprječavanje infekcije (fizički razmak, nošenje maske, respiratorna higijena, higijena ruku, izolacija u slučaju pojave znakova bolesti COVID-19).

Ako se nakon cijepljenja jave zdravstvene tegobe za koje mislite da bi mogle biti povezane s cijepljenjem, javite se svom liječniku, a sumnju na nuspojavu cijepljenja možete i sami prijaviti Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode. Upute su dostupne na web stranici: <https://www.halmed.hr/Farmakovigilancija/Kako-prijaviti-nuspojavu/Postupak/>